

周邊離焦日拋軟性隱形眼鏡注意事項

1. 本產品為日戴、日拋型，專為視力矯正而設計，可減緩 9 至 15 歲兒童近視增加的速度，每次使用完摘下後即應丟棄。
2. 本產品需依醫師處方使用。此為治療性隱形眼鏡，必須經眼科醫師檢查後開立處方使用，且需依醫師指示定期回診追蹤。
3. 有下列症狀時請勿使用本產品
 - A. 眼睛有急性或亞急性的發炎或感染
 - B. 嚴重淚液不足
 - C. 角膜正處於感染狀態
 - D. 眼睛紅或感覺刺痛
4. 配戴隱形眼鏡時**不可以游泳或沖澡**。水中可能含有導致嚴重感染、視力受損或失明的微生物。在游泳池、湖泊或海洋游泳時，若鏡片浸泡在水中請將其丟棄並**立即**更換一副新的鏡片
5. 如果出現以下症狀配戴者應立即摘下鏡片並立即與眼科醫師聯絡
 - A. 眼睛不適
 - B. 畏光
 - C. 大量流淚
 - D. 視覺改變
 - E. 視力受損
 - F. 或其他眼睛問題
6. 日戴型隱形眼鏡**不可配戴過夜**，睡覺時請摘下鏡片。臨床研究顯示若配戴鏡片過夜，將會增加引發嚴重不良反應的風險
7. 為了有效控制近視建議每週至少佩戴**6**天每天至少佩戴**10**小時（不建議超過**15**小時）
8. 初次使用者，可從每天戴 4 至 6 小時開始，每日增加 2 小時
9. 戴上鏡片後再化妝，摘下鏡片後再卸妝
10. 配戴鏡片若覺得眼睛乾燥時請用**不含防腐劑**的人工淚液滋潤眼睛。
11. 配戴隱形眼鏡有可能發生下列問題
 - A. 眼睛刺痛、灼燒感或癢或其他眼睛疼痛
 - B. 眼睛裡感覺有異物
 - C. 淚水分泌過多
 - D. 不正常的眼睛分泌物
 - E. 眼睛發紅
 - F. 視覺清晰度下降
 - G. 視力模糊，物體周圍出現彩虹或光暈
 - H. 畏光
 - I. 眼睛乾燥
12. 如發生上述情形應該立刻執行下列動作
 - A. 立刻取下鏡片
 - B. 如果上述症狀不再出現請仔細檢查鏡片。如果隱形眼鏡有任何損壞勿再帶回。如果再次佩戴後仍出現上述症狀，請立即取出鏡片並立刻諮詢眼科醫師